


# ¿Toma medicamentos para la diabetes tipo 2?

## Sabía que:



- **UNA sola píldora puede ser muy peligrosa.** Cualquier cantidad de medicamento para la diabetes puede ser peligrosa para un niño o un adulto que no la toma habitualmente.
- **Una sola píldora puede hacer que el nivel de azúcar en la sangre baje mucho.** Los síntomas del nivel de azúcar en la sangre bajo incluyen somnolencia, problemas al hablar o al caminar, piel húmeda, vómitos y convulsiones.
- **Llame al Centro de Intoxicaciones de Indiana (Indiana Poison Center, IPC) en cuanto se entere de que se ha administrado el medicamento.** Puede que los síntomas no comiencen hasta 24 horas y que duren varios días.

- Mantenga siempre los medicamentos en el frasco original, con etiqueta de la receta y tapa a prueba de niños (child-resistant cap, CRC).
- Nunca mezcle medicamentos diferentes en el mismo frasco.
- Nunca coloque medicamentos en un recipiente que no sea seguro (por ejemplo, una bolsa plástica para sándwiches, un tazón, una taza o un pastillero).



Si usted o alguien que conoce ha tomado medicamentos que no se les ha recetado, ¡llame al Centro de Intoxicaciones de Indiana al **1-800-222-1222** de inmediato!

Ayuda confidencial, rápida, gratuita, por expertos, todos los días las 24 horas.

**1-800-222-1222**

INDIANA  
**POISON**  
CENTER